

## 012 - მოსი

ISLA-MOOS

საწუწი ტაბლეტები



### შემადგენლობა:

1 საწუწი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიური ნიბთიერება: 80 მგ. წყალზე დამზადებული ისლანდიური ექსტრაქტი (0,4-0,8:1).

სხვა ნიბთიერება: აცაცია (გუმიარტაბლეტიკი), საქართვა, მინერალური ზეთი მსუბუქი, ამიაკის კარამელი (E 150), გაწმენდილი წყალი.

გამოშვების ფორმა

საწუწი ტაბლეტები

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ეფლის ტკივილის დროს გამოსაყენებელი პრეპარატები

### ჩვენებები:

ეფლის ინფექციურ - ანთებითი დაავადებები, როგორიცაა: ფარინგიტი, ლარინგიტი, მათ შორის ალერგიული წარმოშობის (მშრალი გამაღიზიანებელი ხველა, ხმის ჩახლება); მშრალი ხველის სიმპტომური თერაპია მწვავე და ქრონიკული ბრონქიტების და ბრონქული ასთმის დროს კომპლექსური თერაპიის შემადგენლობაში; სახმო იოგების მეტისმეტი დაჭიმვა (მომღერლებში, მასწავლებლებში, ლექტორებში).

პირის დრუს და ხახის ლორწოვანი გარსის სიმშრალე და გადიზიანება (მშრალი, არასაკმარისად ნოტიო ჰაერის ჩასუნთქვა შენობებში გათბობის პერიოდში, კონდიციონერებით აღჭურვილ შენობებში, ცხვირით სუნთქვის შეზღუდვის გამო, და აგრეთვე სპორტული შეჯიბრების დროს)

### უპუშტენება:

არ ინიშნება ცნობილი პიპერმგრძნობელობის არსებობისას პრეპარატის რომელიმე ინგრედიენტის მიმართ.

სხვა სამკურნალო საშუალებებთან ურთიერთქმედება

სხვა სამკურნალო საშუალებებთან ურთიერთქმედება დღეისათვის ცნობილი არ არის.

განსაკუთრებული მითითება და უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები

პრეპარატი ისლა-მოსში შემავალი მცენარეული ექსტრაქტები ზოგჯერ შეიძლება იყოს ამ სამკურნალო საშუალების ფერის და გემოს ცვლილების მიზეზი, რაც გავლენას არ ახდენს მის თერაპიულ მოქმედებაზე.

პრეპარატი ისლა-მოსი სიგროთხილით ინიშნება შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში.

ყველა სხვა ფარმაცევტული პრეპარატების ანალოგიურად, პრეპარატი ისლა-მოსი გამოყენება ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში შესაძლებელია მხოლოდ ექიმთან წინასწარი კონსულტაციის შემდეგ.

დოზირების რეზიმი და გამოყენების წესი

მოზრდილებში და 12 წელზე ზევით ასაკის ბავშვებში მიიღეთ თითო საწუწი ტაბლეტი ყოველ ერთ საათში (12 საწუწი აბამდე დღეში), 4-დან 12 წლამდე ასაკის

ბავშვებში – 1 საწუწნი ტაბლეტი ყოველ 2 საათში (6 საწუწნ აბამდე დღეში). ტაბლეტი ნელა იწუწნება სრულ გახსნამდე.

სამკურნალო საშუალება ისლა-მონსის კარგი ამტანობის გამო, მისი გამოყენება შესაძლებელია ხანგრძლივად ყოველგვარი სიფრთხილის გარეშე.

გარდა ამისა, დაავადების სიმპტომების გაქრობის შემდეგაც რეკომენდებულია ისლა-მონსის გამოყენება კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში სტრაბლეტილური თერაპიული ეფექტის მისაღწევად. თუ 4-5 დღის შემდეგ არ შეინიშნება სიმპტომების გაუმჯობესება, და პირიქით ხდება მათი გაუარესება, ქოშინის, ციების და აგრეთვე ჩირქოვანი და სისხლიანი ნახველის წარმოქმისას, საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ექიმს კონსულტაციისთვის.

### გვერდითი მოქმედება

იშვიათად შესაძლებელია ალერგიული რეაქციების განვითარება.

ვარგისიანობის ვადა:

4 წელი

არ შეიძლება პრეპარატის გამოყენება შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ.

### შენახვა

შეინახეთ არა უმეტეს 25°C ტემპერატურაზე, მშრალ, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

### გაცემის წესი:

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III, გაცემა ურეცეპტოდ.

### შეფუთვა და შიგთავსი

შეფუთვაში – 30 საწუწნი ტაბლეტი (ბლისტერში 10 საწუწნი ტაბლეტი)

### მწარმოებელი საწარმო:

ენგელჰარდ არზნეიმიტელ გმბჸ & კო, კბ.

გერმანია, 61138 ნიდერდორფელდენი

პერცეპტორგშტრასე 3

