

გამოყენების ინსტრუქცია

პროსპან®

Prospan®



ხელის საწინააღმდეგო სიროვი

სავაჭრო დასახელება

პროსპან® ხელის საწინააღმდეგო სიროვი

საერთაშორისო არაპატენტირებული სახელწოდება
არ არსებობს.

სამკურნალო ფორმა

სიროვი

შემადგენლობა

1 მლ სიროვი შეიცავს

აქტიურ ნივთიერებას:

სუროს ფოთლების მშრალ ექსტრაქტს (5–7.5:1) – 7 000 მგ-ს.

ექსტრაგენტი: ეთანოლი 30%

დამხმარე ნივთიერებას:

გასუფთავებული წყალი, კალიუმის სორბატი, ლიმონმჟავა უწყლო, სორბიტოლის ხსნარი 70% (კრისტალი), ქსანტანის გუმფისი, ალუბლის არომატიზატორი (2.5 მლ ხსნარი შეიცავს 0.963 გ სორბიტოლს = 0.08 პურის ერთეულს).

აღწერილობა

ყავისფერი სიროვი, ოდნავ შემღვრეული, ხილის სასიამოვნო გემოთი და ალუბლის სურნელით.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი

ამოსახელებელი პრეპარატები

ათქ კოდი: R05CA

ფარმაკოლოგიური თვისებები

მცენარეული პრეპარატი. შეიცავს საპონინებს, ტრიტერპენოიდებს, ფლავონოიდებს. აქს ამოსახელებელი, ხელის საწინააღმდეგო და სპაზმოლიზური მოქმედება. ამცირებს ნახველის სიბლანტეს და აადგილებს მის გამოდევნას სასუნთქი გზებიდან. გააჩნია ანგიმიკრობული აქტივობა.

გამოყენების ჩვენებები

სიმპტომური საშუალების სახით ზედა სასუნთქი გზების და ფილტვების ანთებითი დაავადებების კომპლექსურ თერაპიაში.

გამოყენების წესი და დოზები

1 წლამდე ასაკის ბავშვებში – 2.5 მლ 2-ჯერ დღეში, 1–5 წლის ასაკის ბავშვებში – 2.5 მლ დღეში 3-ჯერ დღეში, 6–9 წლის ასაკის ბავშვებში – 5 მლ 3-ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და 10 წელზე მეტი ასაკის ბავშვებში – 5–7.5 მლ 3-ჯერ დღეში. დოზირებისთვის გამოიყენება თანდართული საზომი თავსახური.

ყოველი გამოყენების წინ ფლაკონი კარგად შეანჯლიერი.

ყოველი გამოყენების შემდეგ ფლაკონს კარგად დაახურეთ თავსახური!

გამოყენების ხანგრძლივობა

მკურნალობის კურსი შეადგენს 1 კვირას. თერაპიული ეფექტის გასამტკიცებლად რეკომენდებულია დაავადების სიმპტომების გაქრობის შემდეგ მკურნალობა გაგრძელდეს კიდევ 2–3 დღის განმავლობაში.

გვერდითი მოქმედება

- იშვიათად – საფადარაოო ეფექტი.
- ალერგიული რეაქციები.

უკუჩვენებები

- მომატებული მგრძნობელობა პრეპარატის კომპონენტების მიმართ.
- ფრუქტოზას აუტანლობა.

ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან

არ არის ცნობილი.

განსაკუთრებული მითითებები

სიფრთხილით გამოიყენება 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში.

პროსპანი® ხველის საწინააღმდეგო სიროვი არ შეიცავს სპირტს, შაქარს და საღებავებს. შაქრიანი დიაბეტის მქონე პაციენტებში გასათვალისწინებელია, რომ 2.5 მლ სიროვი შეიცავს 0.963 გ სორბიტოლს, რაც შეესაბამება 0.08 პურის ერთეულს.

თერაპიულად ეფექტური სუროს ექსტრაქტის მისაღებად გამოიყენება 30 მოც. % ეთანოლი, რომელიც შემდგომში გამოშრობის პროცესში მთლიანად გამოდის ექსტრაქტიდან.



გამოყენება ორსულობის დროს და ლაქტაციის პერიოდში
ორსულებსა და მეძუძურ დედებში პრეპარატის გამოყენების უსაფრთხოების
შესახებ არასაკმარისი მონაცემების გამო, ამ ჯგუფის პაციენტებში პრეპარატის
გამოყენება რეკომენდებული არ არის.

ზეგავლენა სატრანსპორტო საშუალებების ან პოტენციურად საშიშ მექანიზმების
მართვის უნარზე
არ მოქმედებს.

ჭარბი დოზირება

პრეპარატის მიღებაში იმ დოზით, რომელიც სამჯერ აღემატება სადლელამისო დოზას, შეიძლება გამოიწვიოს გულისრევა, ლებინება და დიარეა.
მკურნალობა – სიმპტომური.

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა

100 მდე სიროფი ფლაკონში. 1 ფლაკონი საზომი თავსახურით გამოყენების ინსტრუქციასთან ერთად მოთავსებულია მუჟაოს კოლოფეში.

შენახვის პირობები

ინახება არა უმეტეს 25°C ტემპერატურაზე ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. კურადღება!

შენახვის პროცესში, სუროს ექსტრაქტის შემცველობის გამო, შესაძლებელია სხინარის ოდნავ შემდგრევა და გემოს უმნიშვნელო შეცვლა, რაც არ მოქმედებს პრეპარატის თერაპიულ ეფექტზე.

ვარგისობის ვადა

3 წელი. ვარგისობის გადა ფლაკონის გახსნის შემდეგ – 3 თვე.

არ გამოიყენოთ შეფუთვაზე მითითებული კარგისობის ვადის გასვლის შემდეგ.

აფთიაქიდან გაცემის წესი

ფარმაცევტული პროდუქტების ჯგუფი III, გაიცემა რეკომენდაციის გარეშე.

მწარმოებელი

ენგელჰარდ ორცნაიმიტელ გმბხ & კო, ვა.

କ୍ଷେତ୍ରପତ୍ରିଗାନ୍ଧିରାଜୀ 3, 61138 ବିଦେଶୀରୁଷିଆଲ୍‌ଲୋଙ୍ଗନ୍ଦୀ, ହାରମିଳିନ୍ଦା

