

გამოყენების ინსტრუქცია
სოლიდაგორენი
(SOLIDAGOREN®)

წვეთები ორალური

ფურცელ-ჩანართი. ინფორმაცია პაციენტებისათვის
წაიკითხეთ ფურცელ-ჩანართი ყურადღებით ამ სამკურნალო საშუალების გამოყენების
დაწყებამდე!



შეინახეთ ეს ფურცელ-ჩანართი, შესაძლებელია თქვენ ხელმეორედ დაგჭირდეთ მისი
წაკითხვა. უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენი ექიმის ან
ფარმაცევტისაგან. საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ მათ რჩევის მისაღებად.

ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები:

გამჭვირვალე ყავისფერი სითხე

სამკურნალო საშუალების შემადგენლობა:

მოქმედი ნივთიერება: წვეთების 10 მლ (=9,5 გ) შეიცავს ოქროწყვეპლას ბალახის (*Solidaginis herba*), ბატის მარწყვა-ბალახის (*Anserinae herba*), შვიტას ბალახის (*Equiseti Herba*) (4,2 : 1,4 : 1) ნარევის თხევადი ექსტრაქტის (1 : 1,5 - 2,1) 7,9 მლ-ს, ექსტრაგენტი: ეთანოლი 50% (მოც/მოც); დამხმარე ნივთიერებები: გაწმენდილი წყალი, ეთანოლი 96%.

გამოშვების ფორმა:

წვეთები ორალური

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:

უროლოგიაში გამოსაყენებელი საშუალებები

ა.თ.ქ. კოდი: G04BP50

ჩვენებები:

ძირითადი (საბაზისო) თერაპია, და ასევე კომპლექსური თერაპიის კომპონენტის სახით
შარდის ბუშტის (ცისტიტი) და თირკმელების (პიელონეფრიტი).

მწვავე და ქრონიკული ინფექციების დროს. თირკმელების არაინფექციური ქრონიკული
დაავადებები (გლომერულონეფრიტი, ინტერსტიციური ნეფრიტი). კენჭების წარმოქმნის
პროცესებისას, მათ შორის მათი მოშორების შემდეგ.

უკუჩვენება:

მომატებული მგრძნობელობა პრეპარატის აქტიური ნივთიერების ან ნებისმიერი სხვა
რომელიმე კომპონენტის მიმართ. არ გამოიყენოთ პრეპარატი სოლიდაგორენი ასტრას
(Asteraceae) ოჯახის მცენარეებზე ალერგიის შემთხვევაში, ვინაიდან აღნიშნული ოჯახის
მცენარეები გამოიყენება პრეპარატის შემადგენლობაში შემავალი მცენარეული ექსტარქის
წარმოებისას.

სოლიდაგორენის შემადგენლობაში შვიტას ექსტრაქტის (*Equisetum arvense*) შემცველობის
გამო, აღნიშნული სამკურნალო საშუალების გამოყენება ორსულობის პერიოდში
უკუნაჩვენებია.

სხვა სამკურნალო საშუალებებთან ურთიერთქმედება:

სხვა სამკურნალო საშუალებებთან ურთიერთქმედების შემთხვევები ცნობილი არ არის.
პრეპარატში ალკოჰოლის არსებობის გამო, მან შეიძლება გავლენა მოახდინოს სხვა
პრეპარატების მოქმედებაზე.

უსაფრთხოების ზომები:

არ გამოიყენოთ პრეპარატი გულის უკმარისობით ან თირკმლის უკმარისობით გამოწვეული
შეშუპების დიურეზული თერაპიის მიზნით. ეს განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია
სანდაზმულ პაციენტებში გამოყენებისას.

შარდში სისხლის არსებობისას, სხეულის მაღალი ტემპერატურის ან სიმპტომატიკის 5
დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში შენარჩუნების შემთხვევაში, რეკომენდებულია მიმართოთ
ექიმს.

პრეპარატი შეიცავს სპირტის 45 % (მოც/მოც)-ს. რეკომენდებული დოზის დაცვის
შემთხვევაში, 30 წვეთის ყოველ მიღებაზე ორგანიზმში ხვდება ალკოჰოლის 0,6 გ.

გამოყენება ორსულობის და ლაქტაციის პერიოდში:

სოლიდაგორენის შემაღენლობაში შეიტას ექსტრაქტის (*Equisetum arvense*) შემცველობის გამო, აღნიშნული სამკურნალო საშუალების გამოყენება ორსულობის პერიოდში უკუნაჩვენებია. სოლიდაგორენის გამოყენება ლაქტაციის პერიოდში შესაძლებელია მხოლოდ ექიმის მიერ ბავშვისთვის რისკის/დედისთვის სარგებლის შეფარდების ზედმიწევნითი შეფასების შემდეგ.

ზემოქმედება ავტოტრანსპორტის მართვის და სპეციალურ მოწყობილობასთან მუშაობის უნარზე გავლენას არ ახდენს.

რეკომენდებული დოზების მიღების შემთხვევაში

ბავშვები:

პრეპარატი არ გამოიყენება 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში.

დოზირების რეჟიმი და გამოყენების წესი:

მოზრდილებში და 12 წელს ზემოთ ასაკის ბავშვებში:

სოლიდაგორენის 20-30 წვეთი 3-ჯერ დღეში. 30 წვეთი 1,4 მლ-ს შეესაბამება. სოლიდაგორენი მიღება საკმარისი რაოდენობის სითხესთან ერთად.

გამოყენების ხანგრძლივობა განისაზღვრება ექიმის მიერ ინდივიდუალურად.

გვერდითი მოქმედება:

ძალზე იშვიათად: ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები და ალერგიული რეაქციები სიხშირე უცნობია: მსუბუქი დარღვევები კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ. ალერგიული რეაქციის პირველი ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში (მაგალითად, გამონაყარი), პრეპარატის მიღება უნდა შეწყდეს. გვერდითი ეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში, რომლებიც მითითებული არ არის ინსტრუქციაში, საჭიროა მიმართოთ ექიმს.

ვარგისობის ვადა:

3 წელი.

შენახვის ვადა ფლაკონის გახსნის შემდეგ 3 თვე.

არ გამოიყენოთ სოლიდაგორენი შეფუთვაზე მითითებული ვარგისობის ვადის ამოწურვის შემდეგ.

შენახვა:

შეინახეთ ორიგინალურ შეფუთვაში არაუმეტეს 25°C ტემპერატურაზე.

შეინახეთ სინათლისაგან დაცულ და ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. აღნიშნული პრეპარატის ვარგისიანობის ვადა შეადგენს 3 წელს.

შენახვის ვადა ფლაკონის გახსნის შემდეგ - 3 თვე.

არ გამოიყენოთ შეფუთვაზე მითითებული ვარგისიანობის ვადის ამოწურვის შემდეგ.

შეფუთვა და შიგთავსი:

წვეტები 20 მლ, 50 მლ და 100 მლ ფლაკონში საწვეთურით და კლასტრასის ხრახნიანი თავსახურით. 1 ფლაკონს ფურცელ-ჩანართთან ერთად ათავსებენ მუყაოს კოლოფული.

გაცემის წესი:

ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III ჯგუფი, გაიცემა რეცეპტის გარეშე

მწარმოებელი:

დრ. გუსტავ კლაინ გმბჸ & კო. კბ

შტაინენფელდ 3, 77736 ცელ ამ ჰარმერსბახ, გერმანია

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG

Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany

