



მომხმარებლის საინფორმაციო ფურცელი

თიროსური® გელი

(Tyrosur® Gel)

თიროსური® გელის გამოყენებამდე, ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ინსტრუქცია, რადგან იგი მნიშვნელოვანი ინფორმაციას შეიცავს.

ეს სამკურნალო საშუალება გაიცემა რეცეპტის გარეშე. საუკეთესო შედეგების მისაღწევად საჭიროა თიროსური® გელის სწორი გამოყენება.

- შეინახეთ ეს ინსტრუქცია, შესაძლებელია თქვენ ისევ დაგჭირდეთ მისი წაკითხვა.
- დამატებითი ინფორმაცია ან რჩევა შეგიძლიათ მიიღოთ თქვენი ექიმის ან ფარმაცევტისაგან.
- სიმპტომების გაუარესებისას ან მდგომარეობის გაუმჯობესების არარსებობისას დაუკავშირდით თქვენს ექიმს.
- თუ რომელიმე გვერდითი ეფექტი გაძლიერდება ან ისეთი გვერდითი ეფექტი აღმოცენდება, რომელიც ინსტრუქციაში არ არის აღნიშნული, გთხოვთ, მიმართოთ თქვენ ექიმს ან ფარმაცევტს.

ინსტრუქცია შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

- 1) რას წარმოადგენს და რისთვის გამოიყენება თიროსური® გელი
- 2) თიროსური® გელის გამოიყენებამდე
- 3) როგორ გამოიყენება თიროსური® გელი
- 4) შესაძლო გვერდითი ეფექტები
- 5) როგორ ინახება თიროსური® გელი

თიროსური® გელი

აქტიური სუბსტანცია: ტიროთრიცინი

100 გ გელი შეიცავს 0.1 გ ტიროთრიცინს.

სხვა ინგრედიენტები: ცეტილპირიდინის ქლორიდის მონოპიდრატი, პროპილენგლიკოლი, ეთანოლი 96%, კარბომერი 40 000 – 60 000, ტრომეტამოლი, გასუფთავებული წყალი.

თიროსური® გელის კანზე გამოყენება შესაძლებელია 5 გ და 25 გ შეფუთვის სახით.

- 1) რას დარმოადგენს და რისთვის გამოიყენება თიროსური® გელი

თიროსური® გელი ადგილობრივი გამოყენების ანტიბიოტიკია.

თიროსური® გელი გამოიყენება მცირე ზედაპირული და შედარებით მშრალი ჭრილობების დროს, ტიროთრიცინის მიმართ მგრძნობიარე პათოგენებით გამოწვეული სუპერინფექციის არსებობისას.

2) თიროსური® გელის გამოიყენებამდე

არ გამოიყენოთ თიროსური® გელი

- ტიროთრიცინის ან პრეპარატის სხვა კომპონენტის მიმართ მომატებული მგრძნობელობის (ალერგიის) დროს.
- ცხვირის ლორწოვან გარსზე.

განსაკუთრებული სიფრთხილის ზომები თიროსური® გელის გამოიყენებისას:

მოერიდეთ გელის თვალთან ახლოს გამოყენებას, რადგან თვალში მოხვედრისას მან შეიძლება წვა გამოიწვიოს.

ორსულობა

მონაცემები თიროსური® გელის ორსულობის დროს გამოიყენების შესახებ არ მოიპოვება. ცხოველებზე კვლევები არ ჩატარებულა, რის გამოც პოტენციური რისკი ადამიანებისათვის უცნობია. ამიტომ თიროსური® გელი ორსულობის დროს არ გამოიყენება.

ძუძუთი კვება

უცნობია გადადის თუ არა ცეტილპირიდინის ქლორიდი ან ტიროთრიცინი დედის რძეში. ამიტომ თიროსური® გელი არ გამოიყენება ძუძუთი კვების პერიოდში.

აგეტომობილის მართვა და მექანიზმების გამოყენება

სპეციალური მითითებები არ არსებობს.

მნიშვნელოვანი გაფრთხილება თიროსური® გელში შემავალი სპეციფიკური ინგრედიენტების შესახებ: თიროსური® გელი შეიცავს პროპილენგლიკოლს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება.

სხვა სამკურნალო საშუალებებთან ურთიერთქმედება

თიროსური® გელის აქტივობაზე სხვა მედიკამენტების მოქმედება ცნობილი არ არის. თიროსური® გელის სხვა სამკურნალო საშუალებების აქტივობაზე მოქმედება ცნობილი არ არის.



თუ თქვენ ღებულობთ ან უახლოეს პერიოდში ღებულობდით სხვა სამკურნალო საშუალებებს, მათ შორის ურეცეპტოს, აუცილებლად აცნობეთ ამის შესახებ მკურნალ ექიმს.

3) როგორ გამოიყენება იიროსური[®] გელი

თიროსური[®] გელი გამოიყენეთ ისე, როგორც მითითებულია ინსტრუქციაში, ან როგორც გირჩევთ თქვენი ექიმი ან ფარმაცევტი. გაუგებარი საკითხები დააზუსტეთ თქვენს ექიმთან ან ფარმაცევთან.

გამოყენების წესი

კანზე წასასმელად.

თუ ექიმი სხვაგარად არ გირჩევთ, რეკომენდებული დოზაა:

საკმარისი რაოდენობის თიროსური[®] გელი წაისვით დაზიანებულ კანზე 2–3-ჯერ დღეში.

როგორ და როდის გამოიყენება თიროსური[®] გელი

წაისვით საკმარისი რაოდენობის გელი დაზიანებულ კანზე დილას (შუადღეს) და საღამოს. კანის მცირე ჭრილობების ან ანთების შემთხვევაში მათი დაფარვა საჭირო არ არის. დიდი ექსუდატის მქონე ჭრილობების დროს რეკომენდებულია დამცავი ბანდაჟი, რომელიც უნდა გამოიცვალოს ყოველ 1–2 დღეში ან ექიმის რეკომენდაციის მიხედვით.

თიროსური[®] გელის გამოყენების ხანგრძლივობა

მკურნალობის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ინფექციის სიმძიმესა და კლინიკურ მდგომარეობაზე. თუ ერთკვირიანი მკურნალობის შემდეგ მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა, საჭიროა ექიმის კონსულტაცია.

თუ შეიძლება მიაკითხეთ თქვენ ექიმს ან ფარმაცევტს, თუ თიროსური[®] გელის გამოყენების დროს გრჩებათ შტაბეჭდილება, რომ სამკურნალო საშუალების მოქმედება ან ძალიან ძლიერია, ან ძალიან სუსტი.

თიროსური[®] გელის ჭარბი გამოყენებისას

რაიმე გართულება მოსალოდნელი არ არის. გააგრძელეთ გამოყენება დანიშნულების მიხედვით. მოულოდნელი სიმპტომების გამოვლენისას დაუკავშრდით ექიმს.

თუ დაგავიწყდათ თიროსური[®] გელის გამოყენება

გამოტოვებული დოზის კომპენსირების შემდეგ გააგრძელეთ მკურნალობა ინსტრუქციაში აღნიშნული დოზირების მიხედვით.



თიროსური® გელის გამოყენების შეწყვეტისას

მკურნალობის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სიმპტომების სიმძიმესა და დაავადების მიმდინარეობაზე. თიროსური® გელის გამოყენების შეწყვეტისას სასურველ შედეგს ვერ მიაღწევთ.

4) შესაძლო გვერდითი ეფექტები

როგორც ყველა სამკურნალო საშუალებას თიროსურ® გელს გააჩნია გვერდითი მოქმედება. გვერდითი ეფექტების სიხშირე ვლინდება შემდეგნაირად:

ძალიან ხშირად: მეტი, ვიდრე 1 პაციენტი 100 პაციენტში.

ხშირად: ნაკლები, ვიდრე 1 პაციენტი 10 პაციენტში, მაგრამ მეტი ვიდრე 1 პაციენტი 100 პაციენტში.

ზოგჯერ: ნაკლები, ვიდრე 1 პაციენტი 100 პაციენტში, მაგრამ მეტი ვიდრე 1 პაციენტი 1000 პაციენტში.

იშვიათად: ნაკლები, ვიდრე 1 პაციენტი 1 000 პაციენტში, მაგრამ მეტი ვიდრე 1 პაციენტი 10 000 პაციენტში.

ძალიან იშვიათად: ნაკლები, ვიდრე 1 პაციენტი 10 000 პაციენტში ან უფრო ნაკლები, მათ შორის ცალკეული შემთხვევები.

კანის ზედაპირის ან კანქვეშა ქსოვილების დაზიანება

ძალიან იშვიათად: ჰიპერგრძნობელობა, კანის წვის შეგრძნების სახით.

ისეთი გვერდითი ეფექტის აღმოცენდებისას, რომელიც ინსტრუქცია არ არის აღნიშნული, გთხოვთ, მიმართოთ თქვენ ექიმს ან ფარმაცევტს.

5) როგორ ინახება თიროსური და გელი

შეინახეთ ბაგშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.

გარგისობის ვადა დაბეჭდილია კოლოფზე და ტუბის ნაკეცზე. არ გამოიყენოთ სამკურნალო საშუალება ამ თარიღის შემდეგ. პირველი გახსნის შემდეგ თიროსური® გელის გამოყენება შეიძლება 3 თვის განმავლობაში.

შეინახეთ არა უმეტეს 25°C ტემპერატურაზე.

გაცემის წესი: ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფი III, გაიცემა ურეცეპტოდ.

საგაჭრო ლიცენზიის მფლობელი და მწარმოებელი

ენგელჰარდ არცნაიმიტელ გმბჸ & კო, კგ.

პერცბერგშტრასე 3, 61138 ნიდერდორფელდენი, გერმანია

