

**30ტანგო**  
აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები  
ფურცელი-ჩანართი. ინფორმაცია პაცინტებისათვის.

აღნიშნული სამკურნალო საშუალების მიღების წინ ყურადღებით წაიკითხეთ ეს  
ინსტრუქცია!

შეინახეთ ეს ინსტრუქცია, შესაძლებელია თქვენ ხელმეორედ დაგჭირდეთ  
მისი წაკითხვა. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ  
თქვენი ექიმის ან ფარმაცევტისაგან. თუ საჭიროდ ჩათვლით, მიმართეთ მათ  
რჩევისთვის.

**ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები:**

მრგვალი ტაბლეტები, დაფარული წითელი ფერის აპკიანი გარსით.

**სამკურნალო საშუალების შემადგენლობა:**

აპკიანი გარსით დაფარული ერთი ტაბლეტი შეიცავს:

აქტიური ნივთიერება: აპკიანი გარსით დაფარული ერთი ტაბლეტი შეიცავს  
ვარდისფერი როდიოლას ფესვების (*Rhodiolarosea*) მშრალ ექსტრაქტს (1.5-5:1) (WS<sup>®</sup>  
1375) - 200 მგ-ს (ექსტრაგენტი: ეთანოლი 60% (მასა/მასა));

დამხმარე ნივთიერებები: მიკროკრისტალური ცელულოზა, ნატრიუმის  
კროსკარმელოზა, კოლოიდური სილიციუმის დიოქსიდი, მაგნიუმის სტეარატი,  
ჰიპომელოზა, სტეარინის მჟავა, რკინის წითელი ოქსიდი (E 172), ტიტანის  
დიოქსიდი (E 171), ქაფის საწინააღმდეგო ემულსია: სიმეტიკონი, მეთოლუელულოზა,  
სორბინის მჟავა.

**სამკურნალო ფორმა:**

აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტები.

**ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:**

მატონიზირებელი საშუალება.

ათქ კოდი - A13A.



**ჩვენებები:**

გამოიყენება ადაპტოგენური მცენარეული პრეპარატის სახით სტრესისა და  
გადაღლილობის დროს მენტალური და ფიზიკური სიმპტომების (გადაღლილობა,  
ნევრასთენია, ვეგეტო-სისხლძარღვოვანი დისტონია, გაღიზიანება, დაძაბულობა)  
შესამცირებლად და პროფილაქტიკისათვის.

**უკუჩვენებები:**

მომატებული მგრძნობელობა ვარდისფერი როდიოლას ფესვების ექსტრაქტის ან  
სამკურნალო საშუალების რომელიმე დამხმარე კომპონენტის მიმართ.

**ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან:**

პრეპარატის ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალო საშუალებებთან არ არის ცნობილი.

განსაკუთრებული მითითებები და სიფრთხილის ზომები:

სამკურნალო საშუალება ვიტანგოს<sup>\*</sup> გამოყენება არ არის რეკომენდებული 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში, აღვავატური მონაცემების არარსებობის გამო. სამკურნალო საშუალება ვიტანგოს<sup>\*</sup> გამოყენება არ არის რეკომენდებული დვიძლისა და თირკმლის ფუნქციის დარღვევის მქონე პაციენტებში, არასაკმარისი მონაცემების გამო.

გამოყენება ორსულობის დროს და ლაქტაციის პერიოდში: უსაფრთხოების სათანადო მონაცემების არარსებობის გამო, სამკურნალო საშუალების გამოყენება ორსულობის დროს და ძუძუთი კვების პერიოდში არ არის რეკომენდებული.

პრეპარატის ზემოქმედება ავტოტრანსპორტისა და მექანიზმების მართვის უნარზე: სამკურნალო საშუალება ვიტანგო<sup>\*</sup> არ მოქმედებს ავტოტრანსპორტისა და სხვა მექანიზმების მართვის უნარზე.

დოზირების რეზიმი და გამოყენების წესი:

მოზრდილებსა და 12 წელზე მეტი ასაკის ბავშვებში ინიშნება 2 ტაბლეტი დღეში, ჭამამდე 30 წთ-ითადრე: ერთი – საუზმის წინ, მეორე – სადილის წინ, ერთ ჭიქა წყალთან ერთად.

გვერდითი მოქმედება:

შესაძლებელია პიპერმგრძნობელობის რეაქციების განვითარება, ასევე პიპოგლიკემია.

გარგისობის ვადა:

4 წელი. რ გამოიყენება შეფუთვაზე აღნიშნული ვარგისობის ვადის გასვლის შემდეგ.

შენახვის პირობები:

ამ სამკურნალო საშუალების შენახვა არ საჭიროებს განსაკუთრებულ პირობებს. შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

გამოშვების ფორმა და შეფუთვა:

აპიანი გარსით დაფარული 20 ტაბლეტი პექ/პვდქ და ალუმინის ფოლგის ბლისტერში. 1 ან 2 ბლისტერი მუყაოს კოლოფში ფურცელ-ჩანართთან ერთად.

გაცემის კატეგორია:

გაიცემა რეცეპტის გარეშე.

მწარმოებელი:

დრ. ვილმარ შვაბე გმბხ და კო. პბ.,  
ვილმარ-შვაბე-შტრასე, 4,  
76227 ქარლსრუე,  
გერმანია

